





Ma ni tsawm htap bawng ring hkra, yawng jawm shakut shang lawm ra.

ကလေးသုကယ်ဖွံ့ဖြိုးစို့ ပိုင်းဝန်းကျည်လုပ်ဆောင်စို့



Karum gahtau ai ni a numhtet ga

ပုဂ္ဂိုလ်သူအတွက် အမှာစာ

- ECI hte seng nna Kanu Kawa ni hpe hpaji jaw lamang hte maren lang na matu yaw shada ai.
 - ECI ဆိုင်ရာမိဘပညာပေးအစီအစဉ်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များအသိပညာပေး အစီအစဉ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
 - Shanghai ai kaw nna (5) ning lapran, ma Kanu Kawa ni hte yu gawn lajang ai ni a matu yaw shada ai re.
 - မွေးဓမ္မာန်အထိ ကလေးမိဘများနှင့် ပြဇာတ်ရွောက်သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
 - ECI magam bungli hta Kanu Kawa ni, mare salang ni yawng pawnghpawm shang lawm na matu yaw shada ai.
 - ECI ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပိဿာစုံများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
 - Ka-ni nanghpam malu masha hte kaga myit hpe hkamsha shangun ai lam ni a majaw n-kung kyang ai ma ni n-nga na matu lam shagu hta sadu sahka ra ai lam hpe madi madun mayu ai re.
 - ပူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် အမြားသော စိတ်ခံစားထိနိုက်စေသည့် အကြောင်းအရာများကြောင့် မသန်စွမ်းကလေးငယ်များ မွေးဖွားလာခြင်းမရှိစေရန်။

Kanu Kawa ni tsa lu ai a majaw ma ni a ntsa byin chye ai manghkang ni law law nga chye ai. Num ni ma hkum ten hta tsa lu ai a majaw shadai kaw nna, ma hpang de tsa nsa du chye ai majaw manghkang byin chye ai. Dai manghkang ni gaw ma a (salum, nra, sate, na) bawnu n-dep ai bawng ring lam hpangkrat ai sha nga shangai ai kaw nna shata 18 du hkra tsa a nsa hkamsha chye ai. Kanu Kawa sha nga, dingku masha langai ngai tsa lu ai lam nga yang tinang a sai kaw nna hpyi ai hpe sha madung tawn nna, ma ni hpe kabai da ai, adup zing -ri ai ni galaw ai majaw ma hpe myit hkra shangun nga ai. Dai re ai majaw num ni tsa lu ai rai yang, ma hkum garai n-rai yang tsa hpe dawn kau ra ai. Ma hkum kanu ni nan n-lu sha ai raitim nta masha langai ngai lu sha ai rai yang, myit ru myit tsang hkrum hkra ai a majaw ma a bawng-ring jat galu kaba wa ai lam ni, hpang hkrat shangun chye nga ai.

မိဘများ အရက်သောက်သုံးခြင်းကြောင့် ကလေးအပေါ်သက်ရောက်နိုင်သော ဆိုးကျိုးများတိုက်ရှိကြအားဖြင့်ဖြစ်စဉ် သွယ်ပိုက်သောနည်းဖြင့်ဖြစ်စဉ် သက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အရက်သောက်သုံးခြင်းကြောင့် ပိုင်းရင်သွေးထဲ့ချက်ကြိုးမှတစ်ဆင့် အရက်အာနိသင်များ ရောက်ရှိပို့သွားနိုင်သောကြောင့် ဆိုးကျိုးအများအပြား သက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ ကလေး၏ ကိုယ်အင်အစိတ်အပိုင်းများ (နှလုံး၊ အရှုံး၊ ကျောက်က်၊ နား) များပုံမှန်မဖြစ်ခြင်း ဦးနောက်ချို့ယွင်းပြီး ညောက်ရည်ပမိုခြင်း၊ ကလေးဖွံ့ဖြိုးကြီးထွေးမှု နောင့်နေ့ဗွဲ့ခြင်း၊ စွဲ့ပြီးကလေးမှ ၁၈ လအထိ ကလေးတွင်အရက်နာကျခြင်းလွှာကျော်များပေါ်ပါကြခြင်း စသဖြင့် ခံစားရပါသည်။ ထိုကြောင့် ပိုင်းသည် အရက်သောက်သုံးတတ်သော အလေ့အယူရှိပါက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပါရနိုင်အတွင်း ဖြတ်သင့်ပါသည်။ ပိုင်းနှင့်ဖောင် (သို့) ပိုသားစုဝင် တစ်ဦးတစ်ယောက် အရက်သော သောက်သုံးသည်ရှိသော် ပိမိ၏ အသွေးအသားဆာလောင်မှတ်သိပ်ခြင်းကိုသာ သိ၍ ကလေးထံသား ရေးမပြုစိုးခြင်း၊ အလေးမထားခြင်းတို့ကြောင့် ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှု ထိခိုက်နောင့်နေ့ဗွဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုပြင် ကလေးထံသား နှိပ်စက်ခြင်းကို ပြုလုပ်ပါခြင်းကြောင့် ကလေးထံ၏ ရုပ်ရိုင်းဆိုင်ရာသာမက ပိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပိုင်းအနေဖြင့် ကိုယ်တိုင်မသောက်သုံးသော်လည်း ပိသားစုဝင် တစ်ဦးတစ်ယောက် သောက်စားမှုးယ်သည်ရှိသော် ပိတ်ပုံပုံရခြင်း၊ ကြောက်ချုံခြင်း၊ ပိတ်သောက ရောက်ရခြင်းတို့ကြောင့် ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှုအား အဘက်ဘက်မှ ထိခိုက်ပေါ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ကလေးထံသား၏ဖွံ့ဖြိုးတဲ့တက်မှုကို အနောင့်အယူကိုဖြစ်စေသော မူးယ်စွဲခြင်းကို ပိသားစုဝင် ရွှေ့ကြံ့ကြံ့သင့်ပါသည်။

Ka-ni nanghpam a majaw sha n-ga kaga lam hpa naw nga ai kun ?

မူးယစ်သေးဝါးကြော်သာမက အခြားသောအကြောင်းအရာများ နှုပါသေးသလား။

ကျေးဇူးတင်လွှာ